

Eesti	Inglise	Sleeve	Standard bypass	Mini bypass
Varased (0-30p)	Early (0-30 days)			
Erakorralised kordusoperatsioonid	<i>Emergency reoperations</i>	1%	1%	1,3%
soole või maoõmbluste leke	<i>Leak</i>	0,8%	0,7%	1%
Verejooks	<i>Haemorrhage (bleeding)</i>	1%	1%	1%
Soolesulgus	<i>Bowel obstruction</i>	0,8%	0,9%	0,16%
Süvaveenide tromboos / kopsuemboolia	<i>Deep vein thrombosis/pulmonary embolism</i>	0,1%	0,1%	0,1%
Surm 90 päeva jooksul peale operatsiooni	<i>90 day mortality</i>	0,02-0,05%	0,02-0,05%	0,02-0,05%
Hilised (30 päeva-5 aastat)	Late (30 days-5 years)			
Mao/peensoole haavand	<i>Ulcer</i>	0,9%	1,7%	1%-2,8%
Mesenteriaalne song (sisemine song soolesulguse või kõhuvaluga), mis võib vajada kordusoperatsiooni	<i>Bowel obstruction or mesenterial hernia requiring reoperation</i>	0%	4,7%	0%
Raske refluks ja kordusoperatsioon seetõttu	<i>Gastrooesophageal reflux (heartburns) requiring reoperation</i>	6-9%	0%	0,5-2%
Vaegtoitumus	<i>Malnutrition</i>	0,5%	0,5%	0,5-1,1%
Raske rauavaegusaneemia (intravenoosne raudravi)	<i>Iron deficiency anaemia requiring intravenous iron administration</i>	2,8%	3,2%	1,25%
Raske Dumping sündroom	<i>Severe dumping syndrome</i>	0%	2,5-3%	0,5%