

Русский	Английский	Sleeve	Стандартный bypass	Мини bypass
<b>Ранние (0-30 дней)</b>	<b>Early (0-30 days)</b>			
Неотложные повторные операции	<i>Emergency reoperations</i>	1%	1%	1,3%
Протекание желудочных или кишечных швов	<i>Leak</i>	0,8%	0,7%	1%
Кровотечение	<i>Haemorrhage (bleeding)</i>	1%	1%	1%
Кишечная непроходимость	<i>Bowel obstruction</i>	0,8%	0,9%	0,16%
Тромбоз глубоких вен / легочная эмболия	<i>Deep vein thrombosis/pulmonary embolism</i>	0,1%	0,1%	0,1%
Смерть в течение 90 дней после операции	<i>90 day mortality</i>	0,02-0,05%	0,02-0,05%	0,02-0,05%
<b>Поздние (30 дней-5 лет)</b>	<b>Late (30 days-5 years)</b>			
Язва желудка / тонкой кишки	<i>Ulcer</i>	0,9%	1,7%	1%-2,8%
Брыжеечная грыжа (внутренняя грыжа с кишечной непроходимостью или болью в животе), нуждающаяся в повторной операции	<i>Bowel obstruction or mesenterial hernia requiring reoperation</i>	0%	4,7%	0%
Тяжелая форма рефлюкса, требующая повторной операции	<i>Gastrooesophageal reflux (heartburns) requiring reoperation</i>	6-9%	0%	0,5-2%
Недостаточное питание	<i>Malnutrition</i>	0,5%	0,5%	0,5-1,1%
Железодефицитная анемия, требующая внутривенного замещения железа	<i>Iron deficiency anaemia requiring intravenous iron administration</i>	2,8%	3,2%	1,25%
Тяжелая форма демпинг-синдрома	<i>Severe dumping syndrome</i>	0%	2,5-3%	0,5%